BASFI Maß für die Funktionseinschränkung bei Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew)



(Summe aus Fragen 1 bis 10 dividiert durch 10)

me:				_					
tum:						E	Bitte zu	treffende Stelle markiere	en:
								, , X, ,	_
Können Sie									A du
ohne Hilfe und Hilfs	smittel (z.B.	Strumpfanzi	eher) So	cken o	der St	rümpf	e anzie		
einfach 0	2	4	1	6		8	1	unmöglich 10	
1 1100 1 1	T '' 04				, 1			D. 1. C. 1. 1. 0	
ohne Hilfe von der F einfach	luite aus na	ich vorn beug	gen, um	einen F	Lugeis	chreibe	er vom	unmöglich	
0	2	4	•	6	•	8	•	10	
ohne Hilfsmittel (z.B	8. Greifzang	e) etwas von	einem h	ohen R	Regal h	erunte	rnehm	en?	
einfach	l I	1 1		1		1		unmöglich	
Ō	2	4		6		8		10	
von einem Stuhl ohn	e Armlehno	e aufstehen, o	hne dab	ei die l	Hände	oder e	ine and	lere Hilfe zu benutzen?	
einfach 0	1 1 2	I I	I	6	I	8	ı	unmöglich	
			uf dam I		liocor			10	
ohne Hilfe vom Bode	en autstenei	n, wenn Sie ai	ur dem i	Kucken	neger	11		unmöglich	
0	2	4	•	6	•	8	•	10	
ohne Schmerzen 10	Minuten ste	ehen, ohne sic	h anzul	ehnen?					
einfach 0	2	4	Ī	6		8	I	unmöglich 10	
ohne Benutzung eine	es Geländer	s oder von G	ehhilfen	12–15	Trepp	enstuf	en steig	gen, 1 Schritt pro Stufe?	
einfach	1 1	I I	1	6	1			unmöglich	
		1 17.				0		10	
über die Schulter sch	nauen, onne	e den Korper	zu aren	en?				unmöglich	
0	2	4	•	6		8	•	10	
	ende Tätigk	eiten verrich	ten (z.B.	krank	engyn	nnastis	che Üb	ungen, Gartenarbeit ode	er
Sport)?			1					unmöglich	
0	2	4	•	6	4	8	•	10	
zuhause oder bei dei	r Arbeit der	n ganzen Tag	aktiv se	in?					
einfach 0	2	I I 4	ı	6	ı	8		unmöglich	